

Uso Veterinário Externo

Com Crono-Liberação

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Acetonido de fluocinolona..... | 0,01 g |
| Clorexidina (gluconato)..... | 1,14 g |
| Veículo com DMSO q.s.p..... | 100,00 mL |

GENERALIDADES:

A formulação especial de Allerdog® **Flucort**, com veículo contendo spherulites catiônicos, permite a formação de uma película protetora sobre a superfície da pele, promovendo uma liberação lenta, gradual e progressiva dos ingredientes ativos, aumentando o tempo de atuação do produto. O acetonido de fluocinolona é um corticosteróide de alta potência, de uso tópico, que tem efeito antiinflamatório inespecífico, resultante de sua ação nos mediadores químicos da inflamação, seja ela de origem química, mecânica, imunológica ou microbiológica. Quando associada ao dimetil sulfóxido, a fluocinolona tem sua

absorção aumentada em 5 vezes. A clorexidina é um agente antisséptico largamente utilizado devido ao seu amplo espectro de atividade e à ação não irritante. Sabe-se que a clorexidina altera a permeabilidade da célula bacteriana, danificando a parede celular, o que faz com que a droga tenha ação sinérgica quando associada a outros antimicrobianos de mecanismo de ação semelhante, incluindo antibióticos sistêmicos.

INDICAÇÕES:

Allerdog® **Flucort** com crono-liberação, é especialmente formulado, para atuar em lesões localizadas, diminuindo a inflamação e controlando o prurido associado aos quadros de dermatite úmida aguda (hot spot), dermatite de lambedura, dermatite alérgica, dermatite de contato, piodermites superficiais e profundas, dermatite interdigital e outras dermatoses responsivas à corticoideterapia, em cães.

Allerdog® **Flucort** tem potente ação bactericida, antiinflamatória e moderada ação antifúngica, atuando contra as principais bactérias, fungos e leveduras causadoras de infecções dermatológicas, tendo como agentes etiológicos:

Staphylococcus aureus, *Staphylococcus intermedius*, *Proteus vulgaris*, *Microsporium spp.* e *Malassezia pachydermatis*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Uso tópico. Aplicar uma quantidade suficiente de Allerdog® **Flucort** para cobrir toda a área afetada, uma a três vezes ao dia, até o desaparecimento das lesões.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilizar em animais com sarna sarcóptica ou demodécica (sarna negra). Não utilizar em animais com infecções dermatológicas generalizadas, onde exista suspeita de septicemia acompanhada de quadro febril.

O produto não deve ser utilizado em fêmeas durante o terço final da gestação.

PRECAUÇÕES:

Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. Utilizar luvas de proteção. Não reutilizar a embalagem vazia.

Allerdog® **Flucort** não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Caso não haja remissão dos sintomas após 3 dias de utilização do produto, consultar o Médico Veterinário para reavaliar o diagnóstico. Este produto é incompatível com detergentes aniônicos.

REAÇÕES ADVERSAS:

Informe ao seu Médico Veterinário, caso apareçam reações adversas tais como aumento da coceira ou irritação local, que não regredam nos primeiros dias de tratamento.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Técnico Responsável: Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves - CRMV/SP. 9321.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8248 em 30/04/2002.

Apresentação: Frascos contendo 30, 50 e 100 mL.

Conservar em local fresco e seco (entre 6°C e 30,0°C), ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:

CEPAV PHARMA LTDA.

Rua Dom Bento Pickel, 605
Casa Verde Alta - São Paulo/SP

CEP: 02544-000

CNPJ: 71.846.612/0001-48

Inscr. Estadual: 113.865.112.115

Atendimento ao consumidor: (11) 3872-2111

www.cepav.com.br

info@cepav.com.br

Indústria Brasileira