

EVITAK[®] 2,5 mg

Esomeprazol 2,5 mg

Comprimidos revestidos de liberação lenta



Uso Veterinário

Fórmula:

Cada comprimido revestido de liberação lenta, de 150,0 mg contém:

Esomeprazol Magnésico Tri-hidratado...2,79 mg.*

Excipientes q.s.p.....150,0 mg.

*Equivalente a 2,5 mg de esomeprazol base

Generalidades:

O Esomeprazol é uma mistura racêmica de 2 isômeros ópticos que atua como inibidor da bomba de prótons inibindo a ação da enzima ATPase H^+/K^+ e, por consequência, inibindo a transposição dos ions H^+ para o lúmen gástrico, bloqueando assim a última fase da produção ácida no estômago. O Esomeprazol é rapidamente absorvido e metabolizado pelo fígado, e age diretamente nas células parietais do estômago. A excreção é realizada, em sua maior porção, por vias urinárias e uma pequena parte pelas vias biliares.

O Esomeprazol promove um melhor controle, com uma farmacocinética mais efetiva, da produção do ácido gástrico quando comparado a todos os outros agentes inibidores da bomba de prótons.

Indicações:

EVITAK[®] 2,5 mg, é indicado para cães e gatos, no tratamento e prevenção de doenças relacionadas ao desequilíbrio do ácido gástrico, como nos casos de úlceras gástricas e duodenais, esofagite por refluxo e nos quadros de hipersecreção gástrica. Também atua como coadjuvante no tratamento de úlceras causadas por *Helicobacter pylori*, associado ao uso de antimicrobianos específicos.

Posologia e modo de usar:

Para uso oral em cães e gatos

A dose de tratamento é de 1,0 mg/Kg de peso vivo (1 comprimido de **EVITAK[®] 2,5 mg** para cada 2,5 Kg de peso vivo), de esomeprazol, uma vez ao dia, 60 minutos antes do fornecimento do alimento e preferencialmente pela manhã.

De acordo com a doença a ser tratada, o tempo de tratamento pode variar de 7 a 28 dias.

No tratamento coadjuvante do *Helicobacter pylori*, o uso recomendado é de 7 dias em associação a outras medicações.

No tratamento de úlceras gastroduodenais o tempo recomendado de

tratamento é de 28 dias.

As dosagens, bem como, a duração do tratamento, poderão ser alteradas de acordo com a gravidade do caso clínico e a critério do Médico Veterinário, podendo a dose terapêutica variar de 0,5 a 1,5 mg/Kg.

Precauções:

EVITAK[®] 2,5 mg deverá ser utilizado sobre supervisão do Médico Veterinário.

O Esomeprazol pode aumentar a absorção e prolongar a meia-vida do diazepam, warfarina e fentoina e acelerar a absorção em pacientes que utilizem digoxina. O Esomeprazol reduz a absorção de alguns antifúngicos com por exemplo o Cetocozazol e o Itraconazol. Alguns outros medicamentos como a Claritromicina e a Rifampicina podem acelerar o metabolismo do Esomeprazol.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em cães e gatos com hipersensibilidade ao Esomeprazol. Os efeitos do uso de **EVITAK[®] 2,5 mg**, em fêmeas em fase de gestação e aleitamento não foram estudados e por este motivo seu uso está contraindicado.

Efeitos colaterais:

Foram relatados casos raros de náuseas, vômitos, diarreia e dispepsia

durante o tratamento.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável técnico:

Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves.
CRMV-SP. 9321

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.938/2001, em 24/09/2001.

Apresentação:

Cartuchos contendo 1, 2, ou 10 blísteres contendo 7, 14 ou 28 comprimidos revestidos de liberação lenta de 150 mg cada.

Conservar em local fresco (à temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.), seco e ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:

CEPAV PHARMA LTDA.

Rua Dom Bento Pickel, 605 -
Casa Verde Alta - São Paulo/SP.
CEP. 02544-000
CNPJ. 71.846.612/0001-48
Inscr. Estadual: 113.865.112.115

Atendimento ao consumidor:

(11) 3872-2111 info@cepav.com.br
www.cepav.com.br
Indústria Brasileira.

EVITAK[®] 5 mg

Esomeprazol 5,0 mg

Comprimidos revestidos de liberação lenta



Uso Veterinário

Fórmula:

Cada comprimido revestido de liberação lenta, de 150,0 mg contém:

Esomeprazol Magnésico Tri-hidratado...5,57 mg.*

Excipientes q.s.p.....150,0 mg.

*Equivalente a 5,0 mg de esomeprazol base

Generalidades:

O Esomeprazol é uma mistura racêmica de 2 isômeros ópticos que atua como inibidor da bomba de prótons inibindo a ação da enzima ATPase H^+/K^+ e, por consequência, inibindo a transposição dos ions H^+ para o lúmen gástrico, bloqueando assim a última fase da produção ácida no estômago. O Esomeprazol é rapidamente absorvido e metabolizado pelo fígado, e age diretamente nas células parietais do estômago. A excreção é realizada, em sua maior porção, por vias urinárias e uma pequena parte pelas vias biliares.

O Esomeprazol promove um melhor controle, com uma farmacocinética mais efetiva, da produção do ácido gástrico quando comparado a todos os outros agentes inibidores da bomba de prótons.

Indicações:

EVITAK[®] 5 mg, é indicado para cães e gatos, no tratamento e prevenção de doenças relacionadas ao desequilíbrio do ácido gástrico, como nos casos de úlceras gástricas e duodenais, esofagite por refluxo e nos quadros de hipersecreção gástrica. Também atua como coadjuvante no tratamento de úlceras causadas por *Helicobacter pylori*, associado ao uso de antimicrobianos específicos.

Posologia e modo de usar:

Para uso oral em cães e gatos

A dose de tratamento é de 1,0 mg/Kg de peso vivo (1 comprimido de **EVITAK[®] 5 mg** para cada 5,0 Kg de peso vivo), de esomeprazol, uma vez ao dia, 60 minutos antes do fornecimento do alimento e preferencialmente pela manhã.

De acordo com a doença a ser tratada, o tempo de tratamento pode variar de 7 a 28 dias.

No tratamento coadjuvante do *Helicobacter pylori*, o uso recomendado é de 7 dias em associação a outras medicações.

No tratamento de úlceras gastroduodenais o tempo recomendado de

tratamento é de 28 dias.

As dosagens, bem como, a duração do tratamento, poderão ser alteradas de acordo com a gravidade do caso clínico e a critério do Médico Veterinário, podendo a dose terapêutica variar de 0,5 a 1,5 mg/Kg.

Precauções:

EVITAK[®] 5 mg deverá ser utilizado sobre supervisão do Médico Veterinário.

O Esomeprazol pode aumentar a absorção e prolongar a meia-vida do diazepam, warfarina e fentoina e acelerar a absorção em pacientes que utilizem digoxina. O Esomeprazol reduz a absorção de alguns antifúngicos com por exemplo o Cetocozazol e o Itraconazol. Alguns outros medicamentos como a Claritromicina e a Rifampicina podem acelerar o metabolismo do Esomeprazol.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em cães e gatos com hipersensibilidade ao Esomeprazol. Os efeitos do uso de **EVITAK[®] 5 mg**, em fêmeas em fase de gestação e aleitamento não foram estudados e por este motivo seu uso está contraindicado.

Efeitos colaterais:

Foram relatados casos raros de náuseas, vômitos, diarreia e dispepsia

durante o tratamento.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável técnico:

Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves.
CRMV-SP. 9321

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.938/2001, em 24/09/2001.

Apresentação:

Cartuchos contendo 1, 2, ou 10 blísteres contendo 7, 14 ou 28 comprimidos revestidos de liberação lenta de 150 mg cada.

Conservar em local fresco (à temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.), seco e ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:

CEPAV PHARMA LTDA.

Rua Dom Bento Pickel, 605 -
Casa Verde Alta - São Paulo/SP.
CEP. 02544-000
CNPJ. 71.846.612/0001-48
Inscr. Estadual: 113.865.112.115

Atendimento ao consumidor:

(11) 3872-2111 info@cepav.com.br
www.cepav.com.br
Indústria Brasileira.

EVITAK[®] 10 mg

Esomeprazol 10 mg

Comprimidos revestidos de liberação lenta



Uso Veterinário

Fórmula:

Cada comprimido revestido de liberação lenta, de 200,0 mg contém:

Esomeprazol Magnésico Tri-hidratado...11,15 mg.*

Excipientes q.s.p.....200,0 mg.

*Equivalente a 10,0 mg de esomeprazol base

Generalidades:

O Esomeprazol é uma mistura racêmica de 2 isômeros ópticos que atua como inibidor da bomba de prótons inibindo a ação da enzima ATPase H^+/K^+ e, por consequência, inibindo a transposição dos ions H^+ para o lúmen gástrico, bloqueando assim a última fase da produção ácida no estômago. O Esomeprazol é rapidamente absorvido e metabolizado pelo fígado, e age diretamente nas células parietais do estômago. A excreção é realizada, em sua maior porção, por vias urinárias e uma pequena parte pelas vias biliares.

O Esomeprazol promove um melhor controle, com uma farmacocinética mais efetiva, da produção do ácido gástrico quando comparado a todos os outros agentes inibidores da bomba de prótons.

Indicações:

EVITAK[®] 10 mg, é indicado para cães e gatos, no tratamento e prevenção de doenças relacionadas ao desequilíbrio do ácido gástrico, como nos casos de úlceras gástricas e duodenais, esofagite por refluxo e nos quadros de hipersecreção gástrica. Também atua como coadjuvante no tratamento de úlceras causadas por *Helicobacter pylori*, associado ao uso de antimicrobianos específicos.

Posologia e modo de usar:

Para uso oral em cães e gatos

A dose de tratamento é de 1,0 mg/Kg de peso vivo (1 comprimido de **EVITAK[®] 10 mg** para cada 10,0 Kg de peso vivo), de esomeprazol, uma vez ao dia, 60 minutos antes do fornecimento do alimento e preferencialmente pela manhã.

De acordo com a doença a ser tratada, o tempo de tratamento pode variar de 7 a 28 dias.

No tratamento coadjuvante do *Helicobacter pylori*, o uso recomendado é de 7 dias em associação a outras medicações.

No tratamento de úlceras gastroduodenais o tempo recomendado de

tratamento é de 28 dias.

As dosagens, bem como, a duração do tratamento, poderão ser alteradas de acordo com a gravidade do caso clínico e a critério do Médico Veterinário, podendo a dose terapêutica variar de 0,5 a 1,5 mg/Kg.

Precauções:

EVITAK[®] 10 mg deverá ser utilizado sobre supervisão do Médico Veterinário.

O Esomeprazol pode aumentar a absorção e prolongar a meia-vida do diazepam, warfarina e fentoina e acelerar a absorção em pacientes que utilizem digoxina. O Esomeprazol reduz a absorção de alguns antifúngicos com por exemplo o Cetocozazol e o Itraconazol. Alguns outros medicamentos como a Claritromicina e a Rifampicina podem acelerar o metabolismo do Esomeprazol.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em cães e gatos com hipersensibilidade ao Esomeprazol. Os efeitos do uso de **EVITAK[®] 10 mg**, em fêmeas em fase de gestação e aleitamento não foram estudados e por este motivo seu uso está contraindicado.

Efeitos colaterais:

Foram relatados casos raros de náuseas, vômitos, diarreia e dispepsia

durante o tratamento.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável técnico:

Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves.
CRMV-SP. 9321

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.938/2001, em 24/09/2001.

Apresentação:

Cartuchos contendo 1, 2, ou 10 blísteres contendo 7, 14 ou 28 comprimidos revestidos de liberação lenta de 200 mg cada.

Conservar em local fresco (à temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.), seco e ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:

CEPAV PHARMA LTDA.

Rua Dom Bento Pickel, 605 -
Casa Verde Alta - São Paulo/SP.
CEP. 02544-000
CNPJ. 71.846.612/0001-48
Inscr. Estadual: 113.865.112.115

Atendimento ao consumidor:

(11) 3872-2111 info@cepav.com.br
www.cepav.com.br
Indústria Brasileira.

EVITAK[®] 20 mg

Esomeprazol 20 mg

Comprimidos revestidos de liberação lenta



Uso Veterinário

Fórmula:

Cada comprimido revestido de liberação lenta, de 200,0 mg contém:

Esomeprazol Magnésico Tri-hidratado...22,30 mg.*

Excipientes q.s.p.....200,0 mg.

*Equivalente a 20,0 mg de esomeprazol base

Generalidades:

O Esomeprazol é uma mistura racêmica de 2 isômeros ópticos que atua como inibidor da bomba de prótons inibindo a ação da enzima ATPase H^+/K^+ e, por consequência, inibindo a transposição dos ions H^+ para o lúmen gástrico, bloqueando assim a última fase da produção ácida no estômago. O Esomeprazol é rapidamente absorvido e metabolizado pelo fígado, e age diretamente nas células parietais do estômago. A excreção é realizada, em sua maior porção, por vias urinárias e uma pequena parte pelas vias biliares.

O Esomeprazol promove um melhor controle, com uma farmacocinética mais efetiva, da produção do ácido gástrico quando comparado a todos os outros agentes inibidores da bomba de prótons.

Indicações:

EVITAK[®] 20 mg, é indicado para cães e gatos, no tratamento e prevenção de doenças relacionadas ao desequilíbrio do ácido gástrico, como nos casos de úlceras gástricas e duodenais, esofagite por refluxo e nos quadros de hipersecreção gástrica. Também atua como coadjuvante no tratamento de úlceras causadas por *Helicobacter pylori*, associado ao uso de antimicrobianos específicos.

Posologia e modo de usar:

Para uso oral em cães e gatos

A dose de tratamento é de 1,0 mg/Kg de peso vivo (1 comprimido de **EVITAK[®] 20 mg** para cada 20,0 Kg de peso vivo), de esomeprazol, uma vez ao dia, 60 minutos antes do fornecimento do alimento e preferencialmente pela manhã.

De acordo com a doença a ser tratada, o tempo de tratamento pode variar de 7 a 28 dias.

No tratamento coadjuvante do *Helicobacter pylori*, o uso recomendado é de 7 dias em associação a outras medicações.

No tratamento de úlceras gastroduodenais o tempo recomendado de

tratamento é de 28 dias.

As dosagens, bem como, a duração do tratamento, poderão ser alteradas de acordo com a gravidade do caso clínico e a critério do Médico Veterinário, podendo a dose terapêutica variar de 0,5 a 1,5 mg/Kg.

Precauções:

EVITAK[®] 20 mg deverá ser utilizado sobre supervisão do Médico Veterinário.

O Esomeprazol pode aumentar a absorção e prolongar a meia-vida do diazepam, warfarina e fentoina e acelerar a absorção em pacientes que utilizem digoxina. O Esomeprazol reduz a absorção de alguns antifúngicos com por exemplo o Cetocozazol e o Itraconazol. Alguns outros medicamentos como a Claritromicina e a Rifampicina podem acelerar o metabolismo do Esomeprazol.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em cães e gatos com hipersensibilidade ao Esomeprazol. Os efeitos do uso de **EVITAK[®] 20 mg**, em fêmeas em fase de gestação e aleitamento não foram estudados e por este motivo seu uso está contraindicado.

Efeitos colaterais:

Foram relatados casos raros de náuseas, vômitos, diarreia e dispepsia

durante o tratamento.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável técnico:

Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves.
CRMV-SP. 9321

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.938/2001, em 24/09/2001.

Apresentação:

Cartuchos contendo 1, 2, ou 10 blísteres contendo 7, 14 ou 28 comprimidos revestidos de liberação lenta de 200 mg cada.

Conservar em local fresco (à temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.), seco e ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:

CEPAV PHARMA LTDA.

Rua Dom Bento Pickel, 605 -
Casa Verde Alta - São Paulo/SP.
CEP. 02544-000
CNPJ. 71.846.612/0001-48
Inscr. Estadual: 113.865.112.115

Atendimento ao consumidor:

(11) 3872-2111 info@cepav.com.br
www.cepav.com.br
Indústria Brasileira.